All Medical Medicine मेडिकल की सारी दवाई

Pain Killer (दर्द की दवाई)

Sandy Dangi

Paracetamol Tablet (पैरासिटामोल टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

Fever (बुखार)

Treat to moderate pain (हल्के मध्यम दर्द में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Ibuprofen + Paracetamol Tablet (आइब्युफ़ेन + पैरासिटामोल टैबलेट)

Sandy Dangi

✅ **Uses(उपयोग)**

Fever (बुखार)

Treat to moderate pain (हल्के मध्यम दर्द में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Diclofenac + Paracetamol Tablet (डिक्लोफ़ेनेक + पैरासिटामोल टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

Fever (बुखार)

Treat to moderate pain (हल्के मध्यम दर्द में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Sandy Dangi

Aceclofenac + Paracetamol Tablet (एसिक्लोफ़ेनेक + पैरासिटामोल टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

Fever (बुखार)
Treat to moderate pain (हल्के मध्यम दर्द में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Sandy Dangi

Ibuprofen 200mg/400mg (आइबूप्रोफेन 200mg/400mg टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

Fever (बुखार)
Treat to moderate pain (हल्के मध्यम दर्द में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Diclofenac 50mg (डिक्लोफ़ेनेक 50mg टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

Pain (दर्द)
Headache (सिर दर्द)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

Sandy Dangi

Anti Allergic Tablets (एंटी एलर्जिक टैबलेट)

Sandy Dangi

Levocertrizine 5mg Tablet (लिवोसेट्राइज़ीन 5mg टैबलेट)

✅ Uses(उपयोग)

to relieve the symptoms of hay fever and hives of the skin.

परागज ज्वर और त्वचा की पित्ती के लक्षणों से राहत पाने के लिए।

✳️ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Cetirizine 10mg Tablet (सेट्रिजीन 100mg टैबलेट)

✅ Uses(उपयोग)

It treats allergy symptoms such as itching, swelling, and rashes by blocking the effects

यह प्रभावों को रोककर एलर्जी के लक्षणों जैसे खुजली, सूजन और चकत्ते का इलाज करता है

✳️ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Hydroxyzine 25mg Tablet (हाइड्रोक्सीज़िन 25mg टैबलेट)



✅ Uses(उपयोग)

to help control anxiety and tension caused by nervous and emotional conditions

घबराहट और भावनात्मक स्थितियों के कारण होने वाली चिंता और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए

✳️ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)

Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sandy Dangi

Avil 25mg/50mg (एवील 25mg/50mg टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

treatment of various allergic conditions.
विभिन्न एलर्जी स्थितियों का उपचार।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Dexamethasone 0.5mg Tablet (डेक्सामेथासोन 0.5mg टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

provides relief for inflamed areas of the body.
शरीर के सूजन वाले क्षेत्रों के लिए राहत प्रदान करता है।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Betamethasone 0.5 mg Tablet (बेटामेथासोन 0.5mg टैबलेट)

✅ **Uses(उपयोग)**

to treat many different inflammatories and allergic conditions including arthritis, lupus, psoriasis, ulcerative colitis, and conditions that affect the skin, blood, eyes, lungs, stomach, and nervous system. गठिया, ल्यूपस, सोरायसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और त्वचा, रक्त, आंखें, फेफड़े, पेट और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली स्थितियों सहित कई अलग-अलग सूजन और एलर्जी स्थितियों का इलाज करने के लिए।



✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Gastritis related medicine गैस्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन

Sandy Dangi

Ranitidine Tablet 150mg / 300mg (रेनीटिडिन 150mg / 300mg टैबलेट)

✅ Uses(उपयोग)

to treat ulcers of the stomach and intestines and prevent them from coming back after they have healed.

पेट और आंतों के अल्सर का इलाज करने और ठीक होने के बाद उन्हें दोबारा होने से रोकने के लिए।

✅ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Omeprazole (ओमीप्राज़ोल)

✅ Uses(उपयोग)

to treat certain conditions where there is too much acid in the stomach

कुछ स्थितियों का इलाज करने के लिए जहां पेट में बहुत अधिक एसिड होता है

✅ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Pantoprazole (पेंटोप्रेज़ोल)

✅ Uses(उपयोग)

Pantoprazole is used to treat symptoms of gastroesophageal reflux disease (GERD).

पैंटोप्राजोल का उपयोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है।

✅ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sandy Dangi

Omeprazole & Domperidone (ओमप्रज़ोल डोमपरोडोन)

✅ **Uses(उपयोग)**

provides relief from symptoms of acid reflux disease like heartburn and chest discomfort.

एसिड रिफ्लक्स रोग के लक्षणों जैसे सीने में जलन और सीने में तकलीफ से राहत मिलती है।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Pantoprazole & Domperidone (पैंटोप्रेज़ोल डॉम्पराइडों)

✅ **Uses(उपयोग)**

to reduce the amount of acid produced by the stomach, to treat or prevent conditions such as heartburn, Gastritis, ulcers and GERD.

पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, सीने में जलन, गैस्ट्रिटिस, अल्सर और जीईआरडी जैसी स्थितियों का इलाज करने या उन्हें रोकने के लिए।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ranitidine & Ondensetron (रेनीटिडिन & ऑडेंसेट्रोन)

✅ **Uses(उपयोग)**

to treat gastro-oesophageal reflux disease (GERD), indigestion, heartburn, acid reflux, nausea, and vomiting.

गैस्ट्रो-ओसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी), अपच, नाराज़गी, एसिड रिफ्लक्स, मतली और उल्टी का इलाज करने के लिए।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Tropical preparation

Creams and why ointment

Povidone Iodine Ointment (पॉवीडोन आयोडीन ऑइंटमेंट)



✅ **Uses(उपयोग)**

treatment and prevention of infections in wounds and cuts.

घावों और घावों में संक्रमण का उपचार और रोकथाम।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Providone iodine liquid (पॉवीडोन आयोडीन लिक्विड)

✅ **Uses(उपयोग)**

treatment and prevention of infections in wounds and cuts.

घावों और घावों में संक्रमण का उपचार और रोकथाम।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Silver Sulphadizine Cream (सिल्वर सल्फाडाईज़िन क्रीम)

✅ **Uses(उपयोग)**

to prevent and treat wound infections in patients with second- and third-degree burns.

दूसरे और तीसरे दर्जे के जले हुए रोगियों में घाव के संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए।

✳️ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Eye Drops (आई ड्राप्स)

Sandy Dangi

Ciprofloxacin Eye Drops (सिप्रोफ़्लोक्सिन आई ड्राप्स)

✅ **Uses(उपयोग)**

to treat infections of the eye, such as bacterial conjunctivitis.
बैक्टीरियल नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसे आंखों के संक्रमण का इलाज करने के लिए।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ciprofloxacin eye ointment (सिप्रोफ़्लोक्सिन आई ऑइंटमेंट)

✅ **Uses(उपयोग)**

to treat infections of the eye, such as bacterial conjunctivitis.
बैक्टीरियल नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसे आंखों के संक्रमण का इलाज करने के लिए।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ciprofloxacin And Dexamethasone Eye Drops
(सिप्रोफ़्लोक्सिन और डैक्सामेथासोन आई ड्राप्स)

✅ **Uses(उपयोग)**

in the treatment of eye infection with inflammation.
सूजन के साथ आंखों के संक्रमण के उपचार में

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sandy Dangi

General products, OTC

Vicks Vaporub (विक्स वेपोरब)

✅ Uses(उपयोग)

relieve cough, congestion, sore muscles, and toenail fungus.
खांसी, जमाव, मांसपेशियों में दर्द और पैर के नाखून की फंगस से राहत दिलाता है।

✳️ Dose (कितना देना होता है)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Vicks Inhaler (विक्स इन्हेलर)

✅ Uses(उपयोग)

Do not use Vicks Inhaler Nasal Stick: if you are allergic to menthol, camphor, siberian pine needle oil, or any of the other ingredients
विक्स इनहेलर नेज़ल स्टिक का उपयोग न करें: यदि आपको मेन्थॉल, कपूर, साइबेरियाई पाइन सुई तेल, या किसी अन्य सामग्री से एलर्जी है

✳️ Dose (कितना देना होता है)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Iodex balm (आयोडेक्स बलम)

✅ Uses(उपयोग)

reduce inflammation and relieve pain.
सूजन कम करें और दर्द से राहत पाएं।

✳️ Dose (कितना देना होता है)

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✳️ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sandy Dangi

Paediatric medicine (बच्चों की दवाई)

Paracetamol Syrup / Drops (पैरासिटमोल सिरप /ड्रॉप)

✅ Uses(उपयोग)

helps to ease pain and bring down high body temperature (fever).

दर्द को कम करने और शरीर के उच्च तापमान (बुखार) को कम करने में मदद करता है।

✅ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml

Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Mefenemic acid syrup (मेफ़ेनेमिक एसिड सिरप)

✅ Uses(उपयोग)

to relieve mild to moderate pain, including menstrual pain

मासिक धर्म के दर्द सहित हल्के से मध्यम दर्द से राहत पाने के लिए

✅ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml

Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Paracetamol & Mefenemic acid syrup

(पैरासिटमोल , मेफ़ेनेमिक ऐसिड सिरप)

✅ Uses(उपयोग)

to treat pain, inflammation, migraine headache, period pain, heavy bleeding during periods, muscle pain, tooth pain, joint pain, pain after

दर्द, सूजन, माइग्रेन सिरदर्द, मासिक धर्म में दर्द, मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव, मांसपेशियों में दर्द, दांत में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर्जरी के बाद दर्द, कान में दर्द, बुखार, फ्लू, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटीइड गठिया का इलाज करने के लिए।

✅ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml

Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)

Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)

Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sandy Dangi

Neopeptine Syrup / drops (निपेप्टिन सिरप / ड्रॉप)

✅ **Uses(उपयोग)**

reducing constipation, gas, colic pain, stomach distension, indigestion, heartburn, and anorexia in newborns and infants.
नवजात शिशुओं और शिशुओं में कब्ज, गैस, पेट दर्द, पेट में गड़बड़ी, अपच, नाराज़गी और एनोरेक्सिया को कम करना।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml
Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Colicaid Drops (कोलिसाइड ड्रॉप)

✅ **Uses(उपयोग)**

relieving flatulence (gas), abdominal pain and infantile colic (abnormal crying or fussiness in a healthy child).
पेट फूलना (गैस), पेट दर्द और शिशु शूल (स्वस्थ बच्चे में असामान्य रोना या घबराहट) से राहत।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml
Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Figolax Drops (फिगोलेक्स ड्रॉप)

✅ **Uses(उपयोग)**

Natural Stool Softener for treating Hard Stools in infants.
शिशुओं में कठोर मल के उपचार के लिए प्राकृतिक मल सॉफ़्नर।

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 1.5-2.5ml
Adult child = BD (दिन में दो बार) 2.5-5ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Cough syrup (कफ सिरप)

Chlorpheniramine (क्लोरफेनिरामाईन)

✅ Uses(उपयोग)

relieves red, itchy, watery eyes; sneezing; itchy nose or throat; and runny nose caused by allergies, hay fever, and the common cold.(लाल, खुजलीदार, पानी भरी आँखों से राहत दिलाता है; छींक आना; नाक या गले में खुजली; और एलर्जी, हे फीवर और सामान्य सर्दी के कारण नाक बहना।)

✳ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✳ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ammonium Chloride (अमोनियम क्लोराइड)

✅ Uses(उपयोग)

helps in thinning and removal of the mucus
(बलगम को पतला करने और निकालने में मदद करता है)

✳ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✳ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Sodium Citrate (सोडियम सिट्रेट)

✅ Uses(उपयोग)

Pain (दर्द)
Headache (सिर दर्द)

✳ Dose (कितना देना होता है)

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✳ Side-Effect (दुष्प्रभाव)

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Menthol Syrup (मेंथोल सिरप)

✅ **Uses(उपयोग)**

Relieve Excessive cough and sore throat
(अत्यधिक खांसी और गले की ख़राश से राहत में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Dextromethorphene and Chlorpheniramine syrup

(डेक्सट्रोमेथरफेन , क्लोर्फ़निरामाइन सिरप)

✅ **Uses(उपयोग)**

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ambroxol Terbutaline Guiaphenesin syrup

(अलब्रोक्सोल टेरबुटालीन गाइआफ़नेसिन सिरप)

✅ **Uses(उपयोग)**

liquefies and loosens thick mucus
(गाढ़े ब्लगम को तरल और ढीला बनाने में)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Child = BD (दिन में एक बार) 2.5-5ml
Adult = BD (दिन में दो बार) 5-10ml

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द) Diarrhoea (दस्त)
Nausea (जी मिचलाना) Vomiting (उल्टी)
Low Blood pressure (रक्त चाप कम)

Ceftriaxone injection
(सेफ़्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन)



✅ **Uses(उपयोग)**

Antibiotics (एंटीबायोटिक)
Bacterial infection (बैक्टेरियल इन्फेक्शन)

✅ **Dose (कितना देना होता है)**

Normal = OD (दिन में एक बार)
Severe = BD (दिन में दो बार)

✅ **Side-Effect (दुष्प्रभाव)**

Stomach Pain (पेट दर्द)
Nausea (जी मिचलाना)
Chest pain (छाती में दर्द)
Diarrhoea (दस्त)
Vomiting (उल्टी)

RL (आरएल)



RI Infusion is a Infusion manufactured by AXA PARENTERALS. It is commonly used for the diagnosis or treatment of arrhythmias, blood and fluid loss , acute calcium deficiency. It has some side effects such as Cardiac toxicity on rapid infusion,Acute toxicity,Chest pain,Black stools.

आरएल इन्फ्यूजन एक्सा पैरेंटेरल्स द्वारा निर्मित एक इन्फ्यूजन है। इसका उपयोग आमतौर पर अतालता, रक्त और तरल पदार्थ की हानि, तीव्र कैल्शियम की कमी के निदान या उपचार के लिए किया जाता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जैसे तीव्र जलसेक पर हृदय विषाक्तता, तीव्र विषाक्तता, सीने में दर्द, काला मल

DNS (डीएनएस)

It is commonly used for the diagnosis or treatment of blood and fluid loss, dehydration , carbohydrate depletion. It has some side effects such as Allergic reactions,Abnormally low phosphate level,Diabetes mellitus,Fever. The salts Dextrose, Sodium Chloride are involved in the preparation of D.N.S Infusion.

इसका उपयोग आमतौर पर रक्त और तरल पदार्थ की हानि, निर्जलीकरण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के निदान या उपचार के लिए किया जाता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जैसे एलर्जी प्रतिक्रियाएं, असामान्य रूप से कम फॉस्फेट स्तर, मधुमेह मेलेटस, बुखार। D.N.S इन्फ्यूजन की तैयारी में डेक्सट्रोज़, सोडियम क्लोराइड लवण शामिल होते हैं।

D5% (डी 5% / 10%)

Dextrose 5% in water is used to treat low blood sugar (hypoglycemia), insulin shock, or dehydration (fluid loss). Dextrose 5% in water is also given for nutritional support to patients who are unable to eat because of illness, injury, or other medical condition

पानी में 5% डेक्सट्रोज़ का उपयोग निम्न रक्त शर्करा (हाइपोग्लाइसीमिया), इंसुलिन शॉक, या निर्जलीकरण (द्रव हानि) के इलाज के लिए किया जाता है। पानी में डेक्सट्रोज़ 5% उन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए भी दिया जाता है जो बीमारी, चोट या अन्य चिकित्सीय स्थिति के कारण खाने में असमर्थ हैं

Sandy Dangi

D25% (डी 25%)

Dextrose 25% Infusion is used for short term fluid replacement. It works by replenishing fluid loss. Thus, it treats hypovolemia that can result due to dehydration, injury, or burns.

डेक्सट्रोज़ 25% इन्फ्यूजन का उपयोग अल्पकालिक द्रव प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। यह द्रव हानि की भरपाई करके काम करता है। इस प्रकार, यह हाइपोवोल्मिया का इलाज करता है जो निर्जलीकरण, चोट या जलने के कारण हो सकता है।

Ciprofloxacin (सिप्रोफ़्लॉक्सिन)

Ciprofloxacin is a broad-spectrum antibiotic which means that it's used to treat a number of bacterial infections, such as: uncomplicated urinary tract infections (UTIs) where other antibiotics are not suitable and complicated UTIs. chest infections (including pneumonia) skin and bone infections.

सिप्रोफ्लोक्सासिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे: सीधी मूत्र पथ संक्रमण (यूटीआई) जहां अन्य एंटीबायोटिक उपयुक्त नहीं हैं और जटिल यूटीआई। छाती में संक्रमण (निमोनिया सहित) त्वचा और हड्डी में संक्रमण।

Metronidazole (मेट्रोनिडाज़ल)



Metronidazole, sold under the brand name Flagyl among others, is an antibiotic and antiprotozoal medication. It is used either alone or with other antibiotics to treat pelvic inflammatory disease, endocarditis, and bacterial vaginosis. It is effective for dracunculiasis, giardiasis, trichomoniasis, and amebiasis.

मेट्रोनिडाज़ोल, फ़्लैगिल ब्रांड नाम के तहत बेचा जाता है, एक एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोज़ोअल दवा है। इसका उपयोग या तो अकेले या अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ पेल्विक सूजन रोग, एंडोकार्टिटिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। यह ड्रैकुनकुलियासिस, जिआर्डियासिस, ट्राइकोमोनिएसिस और अमीबियासिस के लिए प्रभावी है।

Ofloxacin Ornidazole (ऑफ़लोक्सिन ऑर्निडाज़ोल)

to treat urinary tract infections, bacterial infections by inflammation of the peritoneum, eye and ear infections, skin and soft tissue infections, sexually transmitted infections, respiratory infections, vaginal infections, protozoan ...

मूत्र पथ के संक्रमण, पेरिटोनियम की सूजन से जीवाणु संक्रमण, आंख और कान के संक्रमण, त्वचा और कोमल ऊतकों के संक्रमण, यौन संचारित संक्रमण, श्वसन संक्रमण, योनि संक्रमण, प्रोटोजोआ का इलाज करने के लिए ...

Sandy Dangi